

CONDUITE A TENIR EN CAS DE CRISE D'ASTHME

Signes d'appel : gêne respiratoire, essoufflement, respiration sifflante, toux persistante, souvent sèche.

1 Rester calme, rassurer l'élève, l'installer à l'écart du groupe, au calme le laisser assis ; **NE PAS LE LAISSER SEUL.**

2 Faire chercher **la trousse d'urgence en vie scolaire.**

3 Administrer sans délai voir PAI (Projet d'Accueil Individualisé)

Secouer le médicament (exemple la Ventoline **4 à 5 fois avant d'administrer**

Faire inhaler dans la chambre d'inhalation + traitement (exemple Ventoline,.....)

Pulvériser 2 bouffées

Laisser respirer l'élève une dizaine de fois dans la chambre

4 **Si pas d'amélioration dans les 2 minutes** renouveler à nouveau les 2 bouffées dans la chambre d'inhalation.

5 **En cas d'échec du traitement de la crise**

Si au bout de 10 minutes l'élève ne va pas mieux voir aggravation

Redonner le même traitement et appeler le SAMU 15

- Signes d'aggravation : **Appeler d'emblée le SAMU**

- Elève angoissé++++

- Elève qui a du mal à parler

- Epuisement

- Bleuissement des lèvres, sueurs

- Pouls rapide > 120 par minutes

