



CONDUITE A TENIR EN CAS DE MALAISE CHEZ UN DIABETIQUE

MALAISE

Pour des raisons diverses (activité physique inhabituelle, repas trop léger...) la glycémie peut chuter (hypoglycémie.)Cela se manifeste par.

- Une sensation de faim
- Un changement de comportement (indifférence ou excitation inhabituelle, colère subite ou mauvaise humeur...)
- Une pâleur, de la sueur, des vertiges, des tremblements...
- Une difficulté d'expression
- Une absence de réponse aux questions
- Une chute inexplicable
- De la somnolence...

FAIRE UN DEXTRO S' IL A SON APPAREIL

1/LE DEXTRO MET EN EVIDENCE UNE HYPOGLYCEMIE

SI L'ELEVE EST CONSCIENT

- Lui faire prendre du sucre de préférence dans de l'eau ou un sirop ou un jus de fruit.
- En quelque minute le malaise doit disparaître.
- Faire prendre des tranches de pain ou gâteau

SI L'ELEVE EST CONFUS : le mettre couché sur le côté en position latérale de sécurité, lui badigeonner l'intérieur des joues avec du miel ou de la confiture(le sucre est ainsi absorbé par les muqueuses des joues), dès qu'il en est capable lui faire manger un sucre lent exemple du pain.

SI PAS D'AMELIORATION OU SI L'ELEVE EST INCONSCIENT :

Faire appeler le SAMU Tél 15 ou 112 SUR PORTABLE

Faire chercher la trousse d'urgence vie scolaire (REFRIGERATEUR)



Faire une injection de GLUCAGEN dans la face antérieure de la cuisse voir notice intérieur de la boîte, même mal faite elle permet de remonter la glycémie en 10-15 minutes ; dès que l'élève se réveille lui faire manger un sucre lent (pain, gâteau,etc)